

## **A TRAÇA DA UVA (*LOBESIA BOTRANA* DEN & SCHIFFERMÜLLER) NA REGIÃO DA BAIRRADA.**

**Madalena NEVES, Dolores DIAS, Isabel MAGALHÃES, Anabela ANDRADE**

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, Estação de Avisos da Bairrada, Apartado 7, 3780-907 ANADIA, email: [eabairrada@drapc.min-agricultura.pt](mailto:eabairrada@drapc.min-agricultura.pt)

A traça da uva *Lobesia botrana* Den & Schiffermüller é um lepidóptero da família Tortricidae presente nas vinhas da Região da Bairrada e responsável por significativas perdas qualitativas e quantitativas.

Os estragos provocados traduzem-se em prejuízos resultantes da instalação de podridões, em particular da podridão cinzenta. A importância da biomonitorização da traça com recurso a armadilhas delta para precisar o início do período de risco, assim como, a realização da estimativa do risco por observação visual de inflorescências e cachos como forma de avaliar a necessidade e oportunidade de realização de uma intervenção, são essenciais no sucesso do controlo deste inimigo e de seus estragos e prejuízos indirectos.

Na presente comunicação são abordados o comportamento da praga na Região da Bairrada e a oportunidade de tratamento face à estimativa de risco e à estratégia fitossanitária a adoptar.

**Palavras-chave:** Traça da uva, biomonitorização, oportunidade de tratamento, estragos, prejuízos, vinha.